

**ISSN 2518-1726 (Online),
ISSN 1991-346X (Print)**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

Х А Б А Р Л А Р Ы

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

**ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА
СЕРИЯСЫ**

◆
СЕРИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
◆
**PHYSICO-MATHEMATICAL
SERIES**

1 (311)

**ҚАҢТАР – АҚПАН 2017 ж.
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2017 г.
JANUARY – FEBRUARY 2017**

1963 ЖЫЛДЫН ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Бас редакторы
ф.-м.ғ.д., проф., КР ҮФА академигі **F.M. Мұтанов**

Редакция алқасы:

Жұмаділдаев А.С. проф., академик (Қазақстан)
Кальменов Т.Ш. проф., академик (Қазақстан)
Жантаев Ж.Ш. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Өмірбаев Ү.Ү. проф. корр.-мүшесі (Қазақстан)
Жусіпов М.А. проф. (Қазақстан)
Жұмабаев Д.С. проф. (Қазақстан)
Асанова А.Т. проф. (Қазақстан)
Бошкаев К.А. PhD докторы (Қазақстан)
Сұраған Ә. PhD докторы (Қазақстан)
Quevedo Hernando проф. (Мексика),
Джунушалиев В.Д. проф. (Қыргызстан)
Вишневский И.Н. проф., академик (Украина)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Михалевич А.А. проф., академик (Белорус)
Пашаев А. проф., академик (Әзірбайжан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)

«КР ҮФА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы» РКБ (Алматы қ.)
Қазақстан республикасының Мәдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде
01.06.2006 ж. берілген №5543-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы қуәлік

Мерзімділігі: жылдан 6 рет.

Тиражы: 300 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,
www.nauka-nanrk.kz / physics-mathematics.kz

© Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы, 2017

Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.

Г л а в н ы й р е д а к т о р
д.ф.-м.н., проф. академик НАН РК **Г.М. Мутанов**

Р е д а к ц и о н на я кол л е г и я:

Джумадильдаев А.С. проф., академик (Казахстан)
Кальменов Т.Ш. проф., академик (Казахстан)
Жантаев Ж.Ш. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Умирбаев У.У. проф. чл.-корр. (Казахстан)
Жусупов М.А. проф. (Казахстан)
Джумабаев Д.С. проф. (Казахстан)
Асанова А.Т. проф. (Казахстан)
Бошкаев К.А. доктор PhD (Казахстан)
Сураган Д. доктор PhD (Казахстан)
Quevedo Hernando проф. (Мексика),
Джунушалиев В.Д. проф. (Кыргызстан)
Вишневский И.Н. проф., академик (Украина)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Михалевич А.А. проф., академик (Беларусь)
Пашаев А. проф., академик (Азербайджан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)

«Известия НАН РК. Серия физико-математическая».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5543-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год.

Тираж: 300 экземпляров.

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,
www.nauka-nanrk.kz / physics-mathematics.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75.

E d i t o r i n c h i e f
doctor of physics and mathematics, professor, academician of NAS RK **G.M. Mutanov**

E d i t o r i a l b o a r d:

Dzhumadildayev A.S. prof., academician (Kazakhstan)
Kalmenov T.Sh. prof., academician (Kazakhstan)
Zhantayev Zh.Sh. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Umirbayev U.U. prof. corr. member. (Kazakhstan)
Zhusupov M.A. prof. (Kazakhstan)
Dzhumabayev D.S. prof. (Kazakhstan)
Asanova A.T. prof. (Kazakhstan)
Boshkayev K.A. PhD (Kazakhstan)
Suragan D. PhD (Kazakhstan)
Quevedo Hernando prof. (Mexico),
Dzhunushaliyev V.D. prof. (Kyrgyzstan)
Vishnevskyi I.N. prof., academician (Ukraine)
Kovalev A.M. prof., academician (Ukraine)
Mikhalevich A.A. prof., academician (Belarus)
Pashayev A. prof., academician (Azerbaijan)
Takibayev N.Zh. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief.
Tiginyanu I. prof., academician (Moldova)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Physical-mathematical series.

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5543-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 300 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
www.nauka-nanrk.kz / physics-mathematics.kz

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

ISSN 1991-346X

Volume 1, Number 311 (2017), 164 – 172

UDC 517.929

M.B. Saprunova¹, M. Akylbayev², A. Sh. Shaldanbayev³

¹Southern Kazakhstan state pharmaceutical academy;

²Southern Kazakhstan pedagogical university;

³Southern Kazakhstan state university

shaldanbaev51@mail.ru

**ABOUT ONE WAY OF PROTECTION
OF INFORMATION TRANSFER**

Abstract. In this work, with the help of the spectral theory of a functional differential equation, it is studied an advance of waves on a periodic wave guide, in particular, the way of creation of a white noise for the nepryatelsky receiver is shown.

Keywords: wave guide, functional differential equation, range, basis of Riesz, periodic task.

ЭОЖ 517.929

М.Б. Сапрунова¹, М.И. Ақылбаев², А.Ш. Шалданбаев³

¹Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия;

²Оңтүстік-Қазақстан педагогикалық университеті;

³Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университеті

**ЖЕЛІДЕГІ АҚПАРЛАРДЫ ҚОРҒАУДЫҢ
БІР ТӘСІЛІ ТУРАЛЫ**

Аннотация. Бұл еңбекте функционал-дифференциал теңдеулердің спектрләнді теориясы арқылы периодты толқынот арқылы тарайтын толқындардың қасиеттері зерттелді, нәтиежесінде, қарсыластың қабылдауышының залалсыздандыру жолы табылды.

Түйін сөздер:толқынот, функционал-дифференциал теңдеулер, спектр, Рисстің базисі, периодты есеп.

1. Кіріспе.Ақпарларды дыбыс түрінде, сурет түрінде және электромагниттік толқындар түрінде тарайды. Бұл толқындар Джеймс Максвеллдің теңдеулері арқылы өрнектеледі. Қазіргі заманда қажетті ақпарлар құнды тауарға айналды, сондықтан оны дер кезінде әрі сапалы етіп тұтынушыға жеткізу аса маңызды шаруа болып саналады. Байлық жүрген жерде ұрлық бірге жүретіні бұрыннан белгілі нәрсе, дайын асқа тік қасық демекші, керекті мәліметтерді желілерден ұрлаушылар да пайда болды. Оларды қазіргі заман тілімен айтсақ «хаккерлер» дейді. Ньютоның заңы бойынша, әрбір әсерге қарсы әсер табылады, сондықтан, ақпарды қорғаушылар да пайда болды. Ақпарды әр түрлі жолмен қорғауға болады. Оның ең қарапайым үлгісі криптография болса керек, жасырын жазу жолдары ертедегі Египеттіктерге де белгілі болған дейді.

Біз желідегі ақпарларды қорғау жолдарын қарастырмакпзыз. Электромагнитті толқындарды тарататын желілерді, орысша айтқанда, «волновод» деп айтады, ал осы толқындарды таратушы құралдардың жұмыстарының математикалық моделі шекаралық есептер болады. Шекаралық шарттар құралға енген толқын мен онан шыққан толқынның айырмашылығын білдіреді.

Жиі кездесетін волноводтардың бір түрін «периодический волновод» деп атайды. Мұндай волноводқа енген толқын мен онан шыққан толқынның амплитудасы бірдей болуы керек, тек жиілігі мен fazасы өзгеруі мүмкін. Бұл құрал ақпарды қабылдап, оны бізге басқа жиілікпен және басқа fazамен береді. Егер біздің бәсекелестеріміз бұл құралды білмесе, онда олар өздерінің қабылданған ақпарларын оқи алмайды. Мәселенің мән – жайы міне осында.

Келесі, шекаралық есепті периодты волновод дейді:

$$y'(x) = \lambda y(\alpha - x), \quad (1.1)$$

$$y(0) = y(2\pi), \quad (1.2)$$

мұндағы α - дегеніміз $0 \ll \alpha < 2\pi$ аралығында жатқан кез-келген нақты сан, ал λ - спектрлік параметр.

Зерттеуіміз көрсеткендей, (1.1) – (1.2) есептің $L^2(0,2\pi)$ кеңістігінде толымды векторлар системасы бар, сонымен бірге, қосалқы меншікті векторлары бар екен, олар әлгі кеңістікте толымды емес. Бізге керекті ақпарлар негізгі толымды система арқылы арқылы жеткізіледі, ал екінші система арнаны қорғаушының қызыметін аткарады. Ол арнада гүйдеген толқындар таратып, жаудың берекесін қашырады. Біздің таратушының сырын білетін достарымыз бұл екі толқындарды ажыратып, өздеріне керекті ақпарларды сүзгіштен өткізп тазалап ала- алады.

Енді жоғарыдағы (1.1) – (1.2) шекаралық есептің мән – жайына үцілейік. Бірінші толқындардың тендеуі, ал екіншіші шекаралық шартты білдіреді. Толқындар $(0,2\pi)$ аралығында өзгеріске ұшырайды, оның себепшісі α шамасы, ол бізге белгілі, ал жауға белгісіз. Тараптушыға енген толқынды өзгертуші де дәл осы шама. Біз оны толқыннөттің кілті деп атайды. Толқыннөттің спектрлік теориясымен [1] енбек арқылы танысуға болады, функционал-дифференциал тендеудің спектрлік теориясының алғашқы нәтиежелері [2] еңбекте көрініс берді. Операторлардың спектрлік теориясы туралы мәліметтерді [3-15] енбектерден табуга болады. Соңғы кездері функционал-дифференциал тендеулер әртүрлі [16-23] салаларда қолданылып жүр.

2. Зерттеу әдісі

Анықтама 2.1. Егер Гильберттің H кеңістігінің әрбір $x \in H$ элементі осы кеңістікте жинақталатынын мынадай:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k.$$

қатарға таратылатын болса, онда $\{\varphi_k\}$, $k = 1, 2, \dots$ системасын осы H кеңістігінің базисі деп атайды, мұндағы c_k - дегеніміз белгілі бір сандар, ал қатар осы H кеңістігінің нормасы бойынша жинақталады.

Дәл осы сәтте,

$$(\varphi_m, \varphi_n) = \delta_{mn}, m, n = 1, 2, \dots$$

тендіктері орындалса, онда $\{\varphi_k\}$ бұл базисті ортонормаланған дейміз, кейде ортонормалді деп те атайды.

Тригонометриялық система:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2t, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2t, \dots$$

$L^2(0,2\pi)$ кеңістігінде ортонормаланған система болып табылады.

$\{\varphi_k\}$ ($k = 1, 2, \dots$) - дегеніміз H кеңістігінің кез – келген ортонормаланған базисі болсын делік, ал T - дегеніміз осы кеңістікте анықталған қайтымды шектеулі сыйықтық оператор болсын делік. Онда H кеңістігінің кез – келген $f \in H$ векторы үшін:

$$T^{-1}f = \sum_{k=1}^{\infty} (T^{-1}f, \varphi_k) \cdot \varphi_k = \sum_{k=1}^{\infty} (f, (T^{-1})^* \varphi_k) \cdot \varphi_k,$$

және дәл осы себепті

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} (f, \theta_k) \cdot \psi_k,$$

болады, мұндағы

$$\psi_k = T\varphi_k, \theta_k = (T^{-1})^* \varphi_k, (k = 1, 2, \dots).$$

Сонымен бірге

$$(\varphi_m, \varphi_n) = \delta_{mn}, (m, n = 1, 2, \dots).$$

болатыны айдан анық, сондыктан, егер:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \psi_k, \quad (2.1)$$

болса, онда

$$c_k = (f, \theta_k),$$

яғни (2.1) таралымы бірегей.

Сонымен, кез – келген шектеулі қайтымды оператор кез – келген ортонормаланған базисті осы H кеңістігінің басқа бір базисіне аударады. Ортонормаланған базистен осындай жолмен алғынған $\{\varphi_k\}$, $k = 1, 2, \dots$ базисін ортонормаланған базиске эквивалентті базис немесе Рисстің базисі деп атайды [4].

Лемма 2.1. Егер $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ болса, онда мына,

$$\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\cos n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right], \\ n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

функциялар системасы $L^2(0, 2\pi)$ кеңістігінде ортонормаланған базис құрайды.

Дәлелі.

(а) **Ортонормаланғандығы.**

$$\begin{aligned} (\varphi_n, \varphi_m) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\cos n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right] \left[\cos m \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin m \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right] dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\cos(n-m) \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin(n+m) \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right] dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(n-m) \left(x - \frac{\alpha}{2} \right)}{n-m} - \frac{\cos(n+m) \left(x - \frac{\alpha}{2} \right)}{n+m} \right] \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-\sin[(n-m)2\pi - (n-m)\frac{\alpha}{2}] + \sin(n-m)\frac{\alpha}{2}}{n-m} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\cos[(n+m)2\pi - (n+m)\frac{\alpha}{2}] - \cos(n+m)\frac{\alpha}{2}}{n+m} \right] = \\ &= \begin{cases} 1) 0, \quad m \neq \pm n; \\ 2) \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos 2\pi \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) dx = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin 2n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right)}{2n} \Big|_0^{2\pi} = \\ = \frac{1}{4n\pi} [\sin(4n\pi - n\alpha) + \sin n\alpha] = 0, \Rightarrow m = -n, \quad n \neq 0; \\ 3) \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [1 + \sin 2n] \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) dx = \left(x - \frac{\cos 2n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right)}{2n} \right) \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{1}{2\pi} = \\ = \frac{1}{2\pi} \left(2\pi - \frac{\cos(4n\pi - n\alpha) - \cos n\alpha}{2n} \right) = 1, m = n; \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 0, & m \neq \pm n; \\ 0, & m = -n, \quad n \neq 0; \\ 1, & m = n, \quad n \neq 0. \end{cases}$$

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \frac{1}{2\pi}.$$

6) Толымдылығы.

$L^2(0,2\pi)$ кеңістігінің әйтегір бір $f(x) \in L^2(0,2\pi)$ элементі үшін мына, $\int_0^{2\pi} f(x)\varphi_n(x)dx = 0, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ тендіктер орындалсын делік, онда

$$\int_0^{2\pi} f(x) \left[\cos n\left(x - \frac{\alpha}{2}\right) + \sin n\left(x - \frac{\alpha}{2}\right) \right] dx = 0, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

немесе таратып жазсақ,

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} f(x) \left[\cos nx \cos \frac{n\alpha}{2} + \sin nx \sin \frac{n\alpha}{2} + \sin nx \cos \frac{n\alpha}{2} - \cos nx \sin \frac{n\alpha}{2} \right] dx = \\ & = \int_0^{2\pi} f(x) \left[\left(\cos \frac{n\alpha}{2} - \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \cos nx + \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \sin nx \right] dx = \\ & = \left(\cos \frac{n\alpha}{2} - \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx + \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = 0. \end{aligned}$$

Соңғы тендеулерде n - ді $(-n)$ - мен алмастырсақ, онда $f(x)$ функциясының Фурье коэффициенттері үшін сызықтық тендеулер системасын аламыз.

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\cos \frac{n\alpha}{2} - \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx + \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \cdot \\ \quad \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = 0, \\ \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx - \left(\cos \frac{n\alpha}{2} - \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \cdot \\ \quad \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = 0. \end{array} \right.$$

Осы тендеулер системасының анықтауышын есептейік:

$$\begin{aligned} \Delta &= - \left(\cos \frac{n\alpha}{2} - \sin \frac{n\alpha}{2} \right)^2 - \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + \sin \frac{n\alpha}{2} \right)^2 = - \left[\cos^2 \frac{n\alpha}{2} - \right. \\ &\quad \left. - 2 \cos \frac{n\alpha}{2} \sin \frac{n\alpha}{2} + \sin^2 \frac{n\alpha}{2} + \cos^2 \frac{n\alpha}{2} + 2 \cos \frac{n\alpha}{2} \sin \frac{n\alpha}{2} + \sin^2 \frac{n\alpha}{2} \right] = \\ &= -2 \neq 0. \end{aligned}$$

Демек, мына:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

тендіктер орындалады, онда тригонометриялық системаның толымдылығынан $f(x) = 0$ тендігін аламыз.

Лемма 2.2. Егер, мына

$$\varphi_m(2\pi - x) = \varphi_m(x), m = 1, 2, \dots,$$

тендіктері орындалса, $\{\varphi_m\}$ системасы $L^2(0,2\pi)$ кеңістігінде толымсыз болады.

Дәлелі.

Егер

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \ll x \ll \pi, \\ -1, & \pi < x \ll 2\pi, \end{cases}$$

болса, онда кез-келген $\varphi_m(x)$ ($m = 1, 2, \dots$) функциясы үшін, мына

$$\int_0^{2\pi} f(x)\varphi_m(x)dx = \int_0^\pi f(x)\varphi_m(x)dx + \int_\pi^{2\pi} f(x)\varphi_m(x)dx,$$

$$\int_\pi^{2\pi} f(x)\varphi_m(x)dx = \left| \begin{array}{l} x = 2\pi - t \\ dx = -dt \end{array} \right| = - \int_0^0 f(2\pi - t)\varphi_m(2\pi - t)dt = \int_0^\pi f(2\pi - t)\varphi_m(t)dt,$$

$$\int_0^{2\pi} f(x)\varphi_m(x)dx = \int_0^\pi [f(t) + f(2\pi - t)]\varphi_m(t)dt = 0.$$

3. Зерттеу нәтижелері

Теорема 3.1.

(а) Егер $0 \ll \alpha \ll 2\pi$ болса, онда, мына,

$$y'(x) = \lambda y(\alpha - x) \quad (3.1)$$

тендеудің әрбір шешімі, мына,

$$-y''(x) = \lambda^2 y(x); \quad (3.2)$$

Штурм – Лиувилл тендеуінің шешімі болады.

(б) Жоғарыдағы (3.1) тендеудің шешімдер кеңістігі бір салалы.

(в) Аталған (3.1) тендеудің жалпы шешімі мынадай:

$$y(x) = A \cdot \left[\cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right], \quad (3.3)$$

болады, мұндағы A – кез-келген тұрақты шама.

Теорема 3.2.

Егер $0 \ll \alpha < 2\pi$ болса, онда мына:

$$y'(x) = \lambda y(\alpha - x), \quad (3.4)$$

$$y(0) = y(2\pi), \quad (3.5)$$

периодты шекаралық есептің меншікті мәндері накты сандардан құралған екі сериядан тұрады. Олар, мыналар:

$$a) \lambda_n = n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

$$y_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\cos n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin n \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right];$$

$$б) \mu_m = \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4} \right), m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

$$z_m(x) = \cos \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4} \right) \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4} \right) \left(x - \frac{\alpha}{2} \right).$$

Мұндағы $\{y_n(x)\}$ системасы $L^2(0, 2\pi)$ кеңістігінде ортонормаланған базис құрайды, ал $\{z_m\}$ системасы бұл кеңістікте толымсыз система.

4. Талқысы

3.1. теореманың дәлелі

(а) Егер $y'(x) = \lambda y(\alpha - x)$ болса, онда тендеудің екі жағын да дифференциалдасақ, онда

$$y''(x) = -\lambda y'(\alpha - x) = -\lambda \cdot \lambda \cdot y(x) = -\lambda^2 y(x), \Rightarrow -y''(x) = \lambda^2 y(x);$$

(б) Егер $u(x)$ пен $v(x)$ функциялары, мына,

$$u'(x) = \lambda u(\alpha - x) \text{ және } v'(x) = -\lambda v(\alpha - x),$$

тендеудің нөлден өзгеше шешімдері болса, онда жоғарыдағы (а) тұжырымы бойынша, олардың екеуі де бір ғана (3.2) Штурм – Лиувилл тендеуінің шешімі болады. Олардың $x = \frac{\alpha}{2}$ нүктесіндегі Вронскианың есептеп көрелік.

$$W[u, v] = \begin{vmatrix} u & v \\ u' & v' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u & v \\ \lambda u(\alpha - x) & -\lambda v(\alpha - x) \end{vmatrix} = -\lambda[u(x)v(\alpha - x) + v(x)u(\alpha - x)] = -2\lambda \cdot u\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot v\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Егер $\lambda \neq 0$ сәтінде $u\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0$ болса, онда $u'\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0$ және $-u'' = \lambda^2 u$. Онда Коши есебінің шешімінің бірегейлігі туралы теорема бойынша, $u(x) \equiv 0$, ал мұнымыз жоруымызға қайшы. Демек, $u\left(\frac{\alpha}{2}\right) \neq 0$, сол сияқты $v\left(\frac{\alpha}{2}\right) \neq 0$. Сондықтан,

$$W[u, v] = 0$$

Тендігі тек қана $\lambda = 0$ болған сәтте ғана орындалады.

Енді $z(x)$ функциясы (3.1) тендеудің кез-келген шешімі болсын делік, онда

$$z(x) = Au(x) + Bv(x)$$

болады, мұндағы A, B – кез-келген тұрақты шамалар. Онда

$$\begin{aligned} z'(x) &= Au' + Bv' = A\lambda u(\alpha - x) - B\lambda v(\alpha - x) = \lambda[Au(\alpha - x) - Bv(\alpha - x)] = \lambda z(\alpha - x) \\ &= \lambda[Au(\alpha - x) + Bv(\alpha - x)], \end{aligned}$$

мұнан

$$\Rightarrow 2B \cdot v(\alpha - x) = 0, \Rightarrow B = 0, \Rightarrow z(x) = Au(x), A - const.$$

(в) Егер (3.3) өрнегін (3.1) тендеуіне апарып қойсақ,

$$\begin{aligned} y'(x) &= \lambda A \left[-\sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right], \\ y(\alpha - x) &= A \left[\cos \lambda \left(\alpha - x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(\alpha - x - \frac{\alpha}{2} \right) \right] = A \left[\cos \lambda \left(\frac{\alpha}{2} - x \right) + \sin \lambda \left(\frac{\alpha}{2} - x \right) \right] = \\ &= A \left[-\sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right], \\ \lambda y(\alpha - x) &= \lambda A \left[-\sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right] = y'(x). \end{aligned}$$

Дәлелденген теореманың жай – жапсарын аша түсін, мына

$$\begin{aligned} u(x) &= \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right), \\ v(x) &= \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \end{aligned}$$

функциялардың Вронскианың есептейік, есептеу барысында олардың мына:

$$\begin{aligned} u'(x) &= \lambda u(\alpha - x), \\ v'(x) &= -\lambda v(\alpha - x), \end{aligned}$$

тендеулердің шешімдері екенін ескерейік.

$$\begin{aligned} W[u, v] &= \begin{vmatrix} u & v \\ u' & v' \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right), & \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \\ -\sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right), & -\sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) - \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \end{vmatrix} \\ &= \lambda \left\{ - \left[\cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right]^2 - \left[\cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right]^2 \right\} = -\lambda \cdot \\ &\quad \left[\cos^2 \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + 2 \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin^2 \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \cos^2 \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) - \right. \\ &\quad \left. 2 \cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin^2 \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right] = -\lambda(1 + 1) = -2\lambda \neq 0, \\ &\quad (\lambda \neq 0 \text{ сәтінде}). \end{aligned}$$

3.2.теореманың дәлелі. Жоғарыда дәлелденген (3.1) теоремасы бойынша (3.4) тендеудің шешімі

$$y(x) = A \cdot \left[\cos \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(x - \frac{\alpha}{2} \right) \right], A - const,$$

болады, осы өрнекті (3.5) шекаралық шартына апарып қойсақ, онда характеристикалық тендеу аламыз. Осы тендеудің түбірлері (3.4) – (3.5) шекаралық есебінің меншікті мәндері болады.

$$A \cdot \left(\cos \frac{\lambda \alpha}{2} - \sin \frac{\lambda \alpha}{2} \right) = A \cdot \left[\cos \lambda \left(2\pi - \frac{\alpha}{2} \right) + \sin \lambda \left(2\pi - \frac{\alpha}{2} \right) \right],$$

$$A \cdot \left[\cos \frac{\lambda \alpha}{2} - \cos \lambda \left(2\pi - \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \frac{\lambda \alpha}{2} - \sin \lambda \left(2\pi - \frac{\alpha}{2} \right) \right] = 0.$$

Мұнан $A \neq 0$ болғандықтан

$$\Delta(\lambda) = \cos \frac{\lambda\alpha}{2} - \cos \lambda \left(2\pi - \frac{\alpha}{2}\right) - \sin \frac{\lambda\alpha}{2} - \sin \lambda \left(2\pi - \frac{\alpha}{2}\right) = 0. \quad (3.6)$$

Мына,

$$\begin{aligned} \cos A - \cos B &= 2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B-A}{2}, \\ \sin A + \sin B &= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \end{aligned}$$

формулалар арқылы (3.6) өрнекті түрлендірсек, мынадай

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{\frac{\lambda\alpha}{2} + 2\pi\lambda - \frac{\lambda\alpha}{2}}{2} \sin \frac{2\pi\lambda - \frac{\lambda\alpha}{2} - \frac{\lambda\alpha}{2}}{2} - 2 \sin \frac{\frac{\lambda\alpha}{2} + 2\pi\lambda - \frac{\lambda\alpha}{2}}{2} \cos \frac{\frac{\lambda\alpha}{2} - 2\pi\lambda + \frac{\lambda\alpha}{2}}{2} &= 0, \\ 2 \sin \lambda\pi \sin \left(\lambda\pi - \frac{\lambda\alpha}{2}\right) - 2 \cos \left(\frac{\lambda\alpha}{2} - \pi\lambda\right) \sin \lambda\pi &= 0, \\ 2 \sin \lambda\pi [\sin \left(\lambda\pi - \frac{\lambda\alpha}{2}\right) - \cos \left(\lambda\pi - \frac{\lambda\alpha}{2}\right)] &= 0, \end{aligned}$$

тәндіктерді аламыз. Демек, екі түрлі жағдай болуы мүмкін, не

a) $\sin \lambda\pi = 0$, онда $\lambda_n = n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$,

$$y_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [\cos n \left(x - \frac{\alpha}{2}\right) + \sin n \left(x - \frac{\alpha}{2}\right)], n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

не

$$\begin{aligned} \text{б)} \sin \left(\lambda\pi - \frac{\lambda\alpha}{2}\right) - \cos \left(\lambda\pi - \frac{\lambda\alpha}{2}\right) &= 0, \text{ онда} \\ \operatorname{tg} \lambda \left(\pi - \frac{\alpha}{2}\right) &= 1, \lambda_m \left(\pi - \frac{\alpha}{2}\right) = m\pi + \frac{\pi}{4}, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \\ \mu_m &= \frac{\pi}{\pi - \frac{\alpha}{2}} \left(m + \frac{1}{4}\right) = \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4}\right), m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

Бірінші серияның меншікті мәндерімен шатастырмау үшін осында белгілеу енгіздік. Жоғарыдағы лемма 1.2 лемма бойынша, $\{y_n(x)\}$ меншікті функциялар системасы $L^2(0, 2\pi)$ кеңістігінде ортонормаланған базис құрайды, ал $\{z_m(x)\}$ меншікті функциялары периоды 2π - ге тең жұп функциялар. Шынында да,

$$\begin{aligned} z_m(2\pi - \alpha + x) &= \cos \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4}\right) \left(2\pi - \alpha + x - \frac{\alpha}{2}\right) + \sin \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4}\right) \cdot \\ &\quad \left(2\pi - \alpha + x - \frac{\alpha}{2}\right) = \cos \left[2\pi \left(m + \frac{1}{4}\right) + \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \cdot \left(m + \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{\alpha}{2}\right)\right] + \\ &+ \sin \left[2\pi \left(m + \frac{1}{4}\right) + \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{\alpha}{2}\right)\right] = -\sin \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \cos \left(m + \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{\alpha}{2}\right) + \\ &+ \cos \frac{2\pi}{2\pi - \alpha} \left(m + \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{\alpha}{2}\right) = z_m(\alpha - x). \end{aligned}$$

Егер де $t = \alpha - x$ болсын десек, онда $z_m(2\pi - t) = z_m(t)$ боларын көреміз, демек 2.2 лемма бойынша $\{z_m(t)\}$ системасы $L^2(0, 2\pi)$ кеңістігінде толымсыз. Бізге керегі де осы еді.

5.Қорытынды

Аргументі ауытқыған тендеулерді желі ішіндегі ақпарларды қорғаудың математикалық мөдөлі ретінді ұсынуға болады.

ӘДЕБІЕТ

[1] Зильберглейт А.С., Копилевич Ю.И. Спектральная теория регулярных волноводов, Л.:изд.ФТИ им. А.Ф.Иоффе, 1983, 301.

[2] Кальменов Т.Ш., Шалданбаев А.Ш., Ахметова С.Т. К спектральной теории уравнений с отклоняющимися аргументами. Математический журнал, Алматы 2004, т 4, №3 (13), 41-48с.

- [3] Ахиезер Н.И., Глазман И.М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – М.: Наука, 1966.- 543с.
- [4] Гохберг Н.Ц., Крейн М.Г. Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве.- М.: Наука, 1965.-448с.
- [5] Бари Н.К. О базисах в гильбертовом пространстве. //ДАН, 54(1946), 383-386с.
- [6] Рудин У. Основы математического анализа. – М.: Мир, 1966.
- [7] Левитан Б.М., Саргсян Н.С. Введение в спектральную теорию. – М.: Наука, 1970. – 670 с.
- [8] Наймарк М.А. Линейные дифференциальные операторы. – М.: Наука, 1969.
- [9] Айнс Э.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Харьков, 1939.
- [10] Коддингтон Э.А., Левинсон Н. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. – М.: ИЛ, 1958.
- [11] Карташов А.П., Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления. – М.: Наука, 1976.
- [12] Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: ГИФМЛ, 1958.
- [13] Садыбеков М.А. Элементы теории линейных дифференциальных операторов. – Шымкент, 2007.
- [14] Калменов Т.Ш. Краевые задачи для линейных уравнений в частных производных гиперболического типа. – Шымкент: Фылым, 1993.
- [15] Шилов Г.Е. Математический анализ. – М.: Физматгиз, 1960.
- [16] X. Mao, G. Marion, and E. Renshaw, "Environmental Brownian noise suppresses explosions in population dynamics," *Stochastic Processes and their Applications*, vol. 97, no. 1, pp. 95–110, 2002.
- [17] A. Bahar and X. Mao, "Stochastic delay Lotka-Volterra model," *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 292, no.2, pp. 364–380, 2004.
- [18] A. Bahar and X. Mao, "Stochastic delay population dynamics," *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, vol. 11,no. 4, pp. 377–400, 2004.
- [19] X. Mao, C. Yuan, and J. Zou, "Stochastic differential delay equations of population dynamics," *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 304, no. 1, pp. 296–320, 2005.
- [20] S. Pang,F.Deng, andX.Mao, "Asymptoticproperties of stochastic population dynamics," *Dynamics of Continuous, Discrete &Impulsive Systems A: Mathematical Analysis*, vol. 15, no. 5, pp.603–620, 2008.
- [21] F.Wu and Y. Xu, "Stochastic Lotka-Volterra population dynamics with infinite delay," *SIAM Journal on Applied Mathematics*,vol. 70, no. 3, pp. 641–657, 2009.
- [22] Y.Hu, F. Wu, and C. Huang, "Stochastic Lotka-Volterramodels with multiple delays," *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 375, no. 1, pp. 42–57, 2011.
- [23] Y.Hu and C.Huang, "Lasalle method and general decay stability of stochastic neural networks with mixed delays," *Journal of Applied Mathematics and Computing*, vol. 38, no. 1-2, pp. 257–278, 2012.

REFERENCES

- [1] Зильберглейт Ампера-second., Kopilevich Ю.И. Спектральная theory of the regular volnolvod, L.:изд. FTI of A. F. Ioffe, **1983**, 301.
- [2] Kalmenov T. Sh., Shaldanbayev A. Sh., Akhmetova S. T. To the spectral theory of the equations with the deviating arguments. *Mathematical magazine*, Almaty, **2004**, t 4, No. 3 (13), 41-48s.
- [3] Akhiyezer N. I., Glazman I. M. The theory of the linear operators in a Hilbert space. M.: Science, **1966**. 543 pages.
- [4] Gokhberg N. Ts., Crane M. G. Introduction to the theory of the linear self-conjugate operators in a Hilbert space. - M.: Science, **1965**. - 448 pages.
- [5] Bari N. K. O bases in a Hilbert space./It is GIVEN, 54 (**1946**), 383-386s.
- [6] Rudin U. Calculus bases. M.: World, **1966**.
- [7] Levitan B. M., Sargsyan N. S. Introduction to the spectral theory. M.: Science, **1970**. 670 pages.
- [8] Naymark M. A. The linear differential operators. M.: Science, **1969**.
- [9] Айнс Э.Л. Ordinary differential equations. Kharkiv, **1939**.
- [10] Koddington E.A., Levinson N. Theory of ordinary differential equations. M.: OOZE, **1958**.
- [11] Kartashov A. P., Christmas B. L. Ordinary differential equations and bases of a calculus of variations. M.: Science, **1976**.
- [12] Stepanov V. V. Course of differential equations. M.: GIFML, **1958**.
- [13] Sadybekov M. A. Elements of the theory of the linear differential operators. Shymkent, **2007**.
- [14] Kalmenov T. Sh. Boundary value problems for the simple equations in partial derivatives of hyperbolic type. Shymkent: yly, 1993.
- [15] Shilov G. E. Calculus. M.: Fizmatgiz, **1960**.

- [16] X. Mao, G. Marion, and E. Renshaw, "Environmental Brownian noise suppresses explosions in population dynamics," *Stochastic Processes and their Applications*, vol. 97, no. 1, pp. 95–110, **2002**.
- [17] A. Bahar and X. Mao, "Stochastic delay Lotka-Volterra model," *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 292, No. 2, pp. 364–380, **2004**.
- [18] A. Bahar and X. Mao, "Stochastic delay population dynamics," *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, vol. 11, no. 4, pp. 377–400, **2004**.
- [19] X. Mao, C. Yuan, and J. Zou, "Stochastic differential delay equations of population dynamics," *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 304, no. 1, pp. 296–320, **2005**.
- [20] S. Pang, F. Deng, and X. Mao, "Asymptotic properties of stochastic population dynamics," *Dynamics of Continuous, Discrete & Impulsive Systems A: Mathematical Analysis*, vol. 15, no. 5, pp. 603–620, **2008**.
- [21] F. Wu and Y. Xu, "Stochastic Lotka-Volterra population dynamics with infinite delay," *SIAM Journal on Applied Mathematics*, vol. 70, no. 3, pp. 641–657, **2009**.
- [22] Y. Hu, F. Wu, and C. Huang, "Stochastic Lotka-Volterra models with multiple delays," *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 375, no. 1, pp. 42–57, **2011**.
- [23] Y. Hu and C. Huang, "Lasalle method and general decay stability of stochastic neural networks with mixed delays," *Journal of Applied Mathematics and Computing*, vol. 38, no. 1-2, pp. 257–278, **2012**.

УДК 517.929

М.Б. Сапрунова¹, М.И. Ақылбаев², А.Ш. Шалданбаев³

¹Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия;

²Южно-Казахстанский педагогический университет;

³Южно-Казахстанский государственный университет

Об одном способе защиты передачи информации

Аннотация. В данной работе с помощью спектральной теории функционально-дифференциального уравнения изучено распространение волн по периодическому волноводу, в частности, показан способ создания белого шума для неприятельского приемника.

Ключевые слова: волновод, функционально-дифференциальное уравнение, спектр, базис Рисса, периодическая задача.

МАЗМУНЫ

Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Алимов Д.К., Отарбаева А.М., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М. 18 МэВ энергиялы дейтрондардың ${}^6\text{Li}$ ядроларынан серпімді шашырауын зерттеу 5 Жұмабаев Д.С., Темешева С.М. Сызықсыз жүктелген дифференциалдық тендеулер жүйесінің бүкіл өсте шектелген шешімін табу есебінің аппроксимациясы 13 Исахов А. А., Даржанова А. Б. Математикалық модельдеу әдісі арқылы коршаған ортаға жылу электр стансияларының жұмысының әсерін бағалау 20 Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусова А.А. Космологиялық мәселелерді шешудің жуықтау салдары. (1-бөлім) 27 Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусова А.А. Космологиялық мәселелерді шешудің жуықтау салдары. (2-бөлім) 36 Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусова А.А. Космологиялық мәселелерді шешудің жуықтау салдары. (1-бөлім) 46 Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусова А.А. Космологиялық мәселелерді шешудің жуықтау салдары. (2-бөлім) 55 Байжанов С.С., Кулпешов Б.Ш. Әбден О-минималдық теориялардың модельдерін байтуда инварианттық касиеттері 65 Дүйсенбай А.Д., Такибаев Н.Ж., Курмангалиева В.О. Исследование реакций взаимодействия изотопов Li и Be с нейтронами 72 Қабылбеков К.А., Аширабаев Х.А., Абекова Ж.А., Омашова Г.Ш., Қыдырбекова Ж.Б., Джумагалиева А.И. Накты газ изотермаларын зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты орындауды ұйымдастыру 77 Калмурзаев Б.С. L_m^0 Жартыторның екі элементі ершов иерархиясының жындар үйірінің Роджерс жартыторның енүінің бағалаулары жайлы 83 Рябикин Ю.А., Ракыметов Б.А., Байтимбетова Б.А., Айтмуқан Т., Клименов В.В., Муратов Д.А., Мереке А.У., Умирзаков А.У. Қеміртекті қабықшаның параметрлердің касиетін анықтау негізінде кеүікті никельді анодты зерттеу үшін ЭПР әдісінің мүмкіндігі 91 Байтимбетова Б.А., Рябикин Ю.А., Рахметов Б.А. Графен құрылымдарын ультрадыбыс өрісінде графитті ароматикалық қөмірсүткөтер жүйесінде әсер етіп алу және оларды ЭПР әдісімен зерттеу 99 Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Алимов Д.К., Отарбаева А.М., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М. 18 МэВ энергиялы дейтрондардың ${}^6\text{Li}$ ядроларынан серпімді шашырауын зерттеу 104 Жұмабаев Д.С., Темешева С.М. Сызықсыз жүктелген дифференциалдық тендеулер жүйесінің бүкіл өсте шектелген шешімін табу есебінің аппроксимациясы 113 Жаврин Ю.И., Косов В.Н., Молдабекова М.С., Асембаева М.К., Федоренко О.В., Мукамеденкызы В. Ауамен араласатын кейір табиги газ қоспасы компоненттері коэффициенттерінің табы 120 Шыныбаев М.Д., Даирбеков С.С., Жолдасов С.А., Алисақаров Д.Р., Мырзақасова Г.Е., Шекербекова С.А., Садыбек А.Ж. Екі жылжымайтын нұкте проблемасының жаңа нұсқасын үш дене есебінде қолдану 127 Шалданбаев А.Ш., Ақылбаев М.И., Сапрунова М.Б. Толқындардың үзіліштегі бойымен таралуы туралы 137 Жақып-тегі К. Б. $k - \varepsilon$, les, рейнольдс және дәрежелі моделдер туралы 144 Мазакова Б.М., Жақыпов А.Т., Абдикеримова Г.Б. Көзі ашық мәліметтердің негізінде гарыш аппараттарының орбитасын салу 159 Сапрунова М.Б., Ақылбаев М.И., Шалданбаев А.Ш. Желідегі ақпараттарды коргаудың бір тәсілі туралы 164 Смагулова Л.А., Исаева Г.Б. Программалауды оқытуда қолданылатын оқыту технологияларының ерекшеліктері 173 Есқалиев М.Е. Жүктелген элемент әсерінен болатын есепті жынкап шешу үшін шекаралық элементтер әдісі 180 Миндетбаева А.А., Мусаханова М.А. Информатика бойынша сыныптан тыс жұмыстарды жүргізуге арналған акпараттық-бағдарламалық кешен құру 187	5 13 20 27 36 46 55 65 72 77 83 91 99 104 113 120 127 137 144 159 164 173 180 187
--	--

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Алимов Д.К., Отарбаева А.М., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М.</i> Изучение упругого рассеяния дейtronов на ядрах ${}^6\text{Li}$ при энергии 18 МэВ.....	5
<i>Джумабаев Д.С., Темешева С.М.</i> Аппроксимация задачи нахождения ограниченного решения системы нелинейных нагруженных дифференциальных уравнений.....	13
<i>Исаев А. А., Даржанова А. Б.</i> Оценка воздействия функционирования тепловой электростанции на окружающую среду методами математического моделирования.....	20
<i>Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусова А.А.</i> Решение космологической проблемы в приближениях. (Часть-1).....	27
<i>Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусов А.А.</i> Решение космологической проблемы в приближениях (Часть-2)	36
<i>Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусова А.А.</i> Решение космологической проблемы в приближениях (Часть-1)	46
<i>Дроздов А.М., Жохов А.Л., Юнусов А.А., Юнусов А.А.</i> Решение космологической проблемы в приближениях (Часть-2)	55
<i>Байжанов С.С., Кулпешов Б.Ш.</i> Инвариантные свойства при обогащении моделей вполне О-минимальных теорий.....	65
<i>Дүйсенбай А.Д., Такибаев Н.Ж., Құрманғалиева В.О.</i> Li және Be изотоптарының нейтрондармен әрекеттесуі реацияларын зерттеу.....	72
<i>Кабылбеков К.А., Ашираев Х.А., Абекова Ж.А., Омашова Г.Ш., Қыдырыбекова Ж.Б., Джумагалиева А.И.</i> Организация выполнения компьютерной лабораторной работы по исследованию изотерм реального газа	77
<i>Калмурзаев Б.С.</i> Об оценках вложимости L_m^0 в полурешетку Роджерса двухэлементных множеств иерархии Ершова.....	83
<i>Рябикин Ю.А., Ракыметов Б.А., Байтимбетова Б. А., Айтмукан Т., Клименов В.В., Муратов Д.А., Мереке А.У., Умирзаков А.У.</i> Выяснение возможности использования метода ЭПР для изучения пористого никелевого анода на основе определения парамагнитных характеристик углеродных пленок.....	91
<i>Байтимбетова Б.А., Рябикин Ю.А., Рахметов Б.А.</i> Получение графеновых структур в системе графит с ароматическими углеводородами при воздействии ультразвукового поля и изучение их методом ЭПР	99
<i>Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Алимов Д.К., Отарбаева А.М., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М.</i> Изучение упругого рассеяния дейtronов на ядрах ${}^6\text{Li}$ при энергии 18 МэВ.....	104
<i>Джумабаев Д.С., Темешева С.М.</i> Аппроксимация задачи нахождения ограниченного решения системы нелинейных нагруженных дифференциальных уравнений.....	113
<i>Жаврин Ю.И., Косов В.Н., Молдабекова М.С., Асембаева М.К., Федоренко О.В., Мукамеденкызы В.</i> Следовые коэффициенты компонентов некоторых природных газовых смесей, диффундирующих в воздух.....	120
<i>Шинibaев М.Д., Даирбеков С.С., Жолдасов С.А., Алиаскаров Д.Р., Мырзакасова Г.Е., Шекербекова С.А., Садыбек А.Ж.</i> Использование новой версии задачи двух неподвижных центров в задаче трех тел.....	127
<i>Шалданбаев А.Ш., Ақылбаев М.И., Сапрунова М.Б.</i> О распространении волн по разрывной струне.....	137
<i>Джекупов К.Б.</i> О $k - \varepsilon$, les, рейнольдс и степенных моделях.....	144
<i>Мазакова Б.М., Жакыпов А.Т., Абдикеримова Г.Б.</i> Построение орбиты космического аппарата на основе открытых исходных данных.....	159
<i>Сапрунова М.Б., Ақылбаев М.И., Шалданбаев А.Ш.</i> Об одном способе защиты передачи информации.....	164
<i>Смагулова Л.А., Исаева Г.Б.</i> Особенности технологий обучения, применяемых в обучении программирования.....	173
<i>Ескалиев М.Е.</i> Метод граничного элемента для приближенного решения задачи, вызванной действием нагруженного элемента.....	180
<i>Миндетбаева А.А., Мусаханова М.А.</i> Создание информационно-программного комплекса для проведения внеклассных работ по информатике.....	187

CONTENTS

<p>Burtebayev N., Kerimkulov Zh.K., Alimov D.K., Otarbayeva A.M., Mukhamejanov Y.S., Janseitov D.M. Study of elastic scattering of deuterons from ${}^6\text{Li}$ AT energy 18 MeV..... 5</p> <p>Dzhumabaev D.S., Temesheva S.M. Approximation of problem for finding the bounded solution to system of nonlinear loaded differential equations 13</p> <p>Issakov A.A., Darzhanova A.B. Assessing the impact of thermal power plants in the aquatic environment in reservoir-cooler..... 20</p> <p>Drozdov A.M., Zhokhov A.L., Yunusov A.A., Yunusova A.A. Solution of the cosmological problem in the approximations. (Part-1)..... 27</p> <p>Drozdov A.M., Zhokhov A.L., Yunusov A.A., Yunusova A.A. Solution of the cosmological problem in the approximations. (Part-2) 36</p> <p>Drozdov A.M., Zhokhov A.L., Yunusov A.A., Yunusova A.A. Solution of the cosmological problem in the approximations. (Part-1) 46</p> <p>Drozdov A.M., Zhokhov A.L., Yunusov A.A., Yunusova A.A. Solution of the cosmological problem in the approximations. (Part-2) 55</p> <p>Baizhanov S.S., Kulpeshov B.Sh. Invariant properties at expanding models of quite O-minimal theories..... 65</p> <p>Duisenbay A.D., Takibayev N.ZH., Kurmangalieva V.O. Research of the reactions of Li and Be isotopes with neutrons.... 72</p> <p>Kabylbekov K.A., Ashirbaev H. A., Abekova ZH. A., Omashova G.Sh., Kydyrbekova Zh. B., Dzhumagalieva A.I. The organization of performance of computer laboratory operation on examination of isothermal curves real gaza..... 77</p> <p>Kalmurzayev B.S. On assessments of embeddability L_m^0 in rogers semilattice of two-element families of sets in the Hierarchy of Ershov 83</p> <p>Ryabikin Y.A., Rakymetov B.A., Baytimbetova B.A., Aytukan T., Klimentov V.V., Muratov D.A., Mereke A.U., Umirzakov A.U. Identification of capabilities of the EPR method in studying porous nickel anodes based on definition of paramagnetic characteristics of carbon films..... 91</p> <p>Baitimbetova B.A., Ryabikin Yu.A., Rachmetov B.A. Production of graphene structures in the graphite with an aromatic hydrocarbon on exposure to ultrasonic fields and investigation of their EPR..... 99</p> <p>Burtebayev N., Kerimkulov Zh.K., Alimov D.K., Otarbayeva A.M., Mukhamejanov Y.S., Janseitov D.M. Study of elastic scattering of deuterons from ${}^6\text{Li}$ at energy 18 MeV..... 104</p> <p>Dzhumabaev D.S., Temesheva S.M. Approximation of problem for finding the bounded solution to system of nonlinear loaded differential equations 113</p> <p>Zhavrin Yu.I., Kosov V.N., Moldabekova M.S., Asembaeva M.K., Fedorenko O.V., Mukamedenkyzy V. Trace coefficients of components of some natural gaseous mixtures diffusing into the air..... 120</p> <p>Shinibaev M.D., Dairbekov S.S., Zholdasov S.A., Myrzakasova G.E., Aliaskarov D.R., Shekerbekova S.A., Sadybek A.G. Use of the new version of the problem of two centers in the three-body problem..... 127</p> <p>Shaldanbayev A. Sh., Akylbayev M., Saprunova M.B. About an advance of waves on an explosive string..... 137</p> <p>Jakupov K.B. About $k - \varepsilon$, les, reynolds and power model..... 144</p> <p>Mazakova B.M., Zhakypov A.T., Abdikerimova G.B. The spacecraft's orbit consecution based on open source data..... 159</p> <p>Saprunova M.B., Akylbayev M., Shaldanbayev A. Sh. About one way of protection of information transfer..... 164</p> <p>Smagulova L.A., Issayeva G.B. Features of the learning technologies used in teaching programming..... 173</p> <p>Yeskaliyev M.Ye. Boundary element method for the approximate solution of the problem caused by the action of a loaded element..... 180</p> <p>Mindetbayeva A.A., Musahanova M.A. Creation of the of a software complex for extracurricular activities on informatics..... 187</p>	<hr/>
---	-------

**Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайтах:

[www:nauka-nanrk.kz](http://www.nauka-nanrk.kz)

<http://www.physics-mathematics.kz>

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Редакторы *M. С. Ахметова, Д.С. Аленов, Т.А. Апендиев, А.Е. Бейсебаева*
Верстка на компьютере *A.M. Кульгинбаевой*

Подписано в печать 01.02.2017.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
11,4 п.л. Тираж 300. Заказ 1.

*Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19*